

Le traitement des racines

Parfois, lorsque la pulpe dentaire est irrémédiablement atteinte (la plupart du temps par une atteinte carieuse profonde), il devient alors nécessaire, pour éviter toute infection et permettre la reconstitution de la dent, de procéder au traitement des racines.

•Comment ?

Après avoir isolé la dent de la salive environnante et procédé à une éventuelle anesthésie, le dentiste va préparer l'accès aux canaux des racines. Ensuite, il pourra désinfecter, nettoyer et élargir ces canaux afin de permettre leur obturation par un matériau spécial prévu à cet effet. La gutta percha est actuellement le matériau privilégié pour obtenir l'étanchéité souhaitée du système canalaire.

•Pourquoi ?

Le traitement des racines vise à limiter au maximum l'apparition ultérieure d'une infection à l'extrémité des racines et qui pourrait se transmettre aux tissus environnants. Si il est effectué alors que la dent était déjà infectée, il permettra la disparition de cette infection et la guérison de la dent.

•Conséquences

Outre le changement de teinte qui survient généralement après quelques semaines, une dent dévitalisée est fragilisée en raison de sa déshydratation et de l'obturation volumineuse de la cavité d'accès aux racines. Son risque de fracture est alors important. Il devient donc nécessaire de la consolider pour sa préservation à long terme. C'est pourquoi, la réalisation d'une couronne constitue la suite logique et sécuritaire d'une dévitalisation dentaire.

Les étapes successives d'un traitement radiculaire:

